

العناية بمو اليد الحيوانات المجتررة من الولادة حتى الفطام

اعداد

د. كامل فتال م. خالد طه

العناية بمواليد الحيوانات المجترة من الولادة حتى الفطام

- ان أهم شيء في رعاية الحيوانات المجترة هو التربية وإدارة الرعي وأساليب التغذية والإنتاج كالحلابة والفطام ثم أساليب الوقاية ضد الأمراض واتباع برنامج الوقاية السنوي ضد الأمراض السارية.

علامات الشيع

• تظهر علامته في الانثى بانتفاخ الضرع وتحجره قليلا
وتصدر الأنثى أصوات خاصة، وترفع رأسها للأعلى، وترفع
الأنف للاسترواح والتطلع بعين حائرة ثم هز الذيل
والاستكانة للذكر.

علامات الحمل

• انقطاع الشبياع وكبير حجم البطن والضرع وانتفاخ الحيا
وزيادة الشهية وخاصة للدريس، وفي هذه المرحلة يجب
حماية العنزات الحوامل ومنعها من القفز والعدو وجعلها
بعيدة عن تأثير البردا لشديد خوفا من الإجهاض.

علامات الولادة

- انتفاخ الضرع والحلمات وثغاء الحوامل وسيلان ماء من حياها، وقبل الولادة بيومين تبدو الأنثى مضطربة، ويمتلئ الضرع بالحليب بسرعة، وتظهر الأنثى وكأن بها تقلص بالبطن وترتخي الأربطة الدبوسية ثم يتبع ذلك خروج افرازات بيضاء نشوية وكثيفة من الحيا ويتغير لونها بسرعة الى داكنة وفي مرحلة متقدمة لأعراض الولادة تبدو الأنثى منضغطة باذلة جهدا واضحا.

الوضع (الولادة)

- عند بدء الولادة تركز الأنثى بزواوية هادئة ثم تدفع لتخرج ماء أبيض يليه كيس الماء (يجب أن لايفتح) سرعان ما ينفجر لتخرج منه القوائم الأمامية ثم الرأس والأطراف الخلفية (في الولادة الطبيعية).
- وفي الحالات غير الطبيعية يفضل التدخل للمساعدة حيث يمكن عندها شدة بلطف وتوافق مع ضغط الأم (الطلق)، ويمكن استخدام الأصابع لتصحيح الخطأ الحاصل على القوائم الأمامية و الرأس، وذلك بعد غسل الأيدي وتعقيمها بالصابون والماء الدافئ وقص الأظافر وتعقيمها.
- وفي بعض الحالات يكون المجيء خلفي، أي تخرج القوائم الخلفية أولاً، وفي أغلب هذه الحالات تكون المساعدة ضرورية عن طريق شد قوائم المولود بلطف حتى يخرج.

يراعى عند الولادة ما يلي:

- تزال الأغشية المخاطية عن أنف المولود فور ولادته لتسهيل عملية التنفس.
- يقص الحبل السري على بعد ٣ سم من البطن ويعصر الحبل لإخراج السوائل الموجودة فيه ثم يعقم بصبغة اليود.
- قبل ارضاع المولود من أمه يجب حلب زخات قليلة من الضرع للتأكد من أن الضرع غير مصاب بالتهاب.
- يساعد المولود على الرضاعة للمرة الأولى، وتصبح هذه المساعدة ضرورية جدا للمواليد التوأمية أو الثلاثية التي تولد ضعيفة البنية، و بعد ذلك تصبح المواليد قادرة على الرضاعة لوحدها.
- يجب أن تخرج المشيمة من العنزة الوالدة خلال (٦-١٢) ساعة بعد الولادة واذا لم تخرج يستدعى الطبيب.

تنشئة المواليد

- تترك المواليد مع أمهاتها لمدة (٤-٥) أيام في حظيرة فردية لرضاعة السرسوب من جهة، ولإلزام العنزة بتبني مواليدها من جهة أخرى.
- السرسوب: لونه أصفر، غني بالفيتامينات والمضادات الحيوية والألبومين، وهذه المركبات سهلة الهضم وذات قيمة غذائية
- الصمغة: يجب أن يتناولها المولود خلال نصف ساعة من الولادة حتى يتم القضاء على الجراثيم التي تدخل الى أمعاء المولود بعد الولادة مباشرة.
- وعند ولادة المولود يوجد على الطبقة الداخلية لأمعائه مادة لونها أصفر تدعى (جعي) وهذه المادة يجب إزالتها من أجل عمل الأمعاء وبالتالي استمرار حياة المولود، ولا يتم إزالة هذه المادة الا عند رضاعة المولود للسرسوب.
- ان لحس العنزة لابنها المولود حديثا مفيد جدا للعنزة لأن بقايا السائل الجنيني الموجود على جسم المولود يحتوي على هرمون الأكسيتوكسين وهذا الهرمون له فائدتين:
- -يساعد على اخراج المشيمة بسرعة من الأم الوالدة.
- -يساعد على سرعة إدرار الصمغة من الأم.

لانتقاء ذكور التربية يجب أن يتوفر فيها الصفات التالية:

- ١- معدل نمو جيد
- ٢- حيوية جيدة
- ٣- خصي مناسبة ويجب أن تكون متباعدة وليست مفصولة بشكل كبير، حجمها متناسب مع حجم الذكر (هذه المواصفات للخصي تدل أن بنات التيس سيكون لها ضرع مكعب الشكل).
- ٤- الصفات الإنتاجية للأب والأم جيدة.
- ٥- صفات السائل المنوي جيدة.

لانتقاء اناث التربية يجب أن يتوفر

فيها الصفات التالية:

١- معدل نمو جيد

٢- الصفات الإنتاجية للأم والأب

جيدة.

٣- البعد بين الحلمات في الأنتى

المنتخبة لا تقل عن ثلاثة أصابع

تتبيهاات للمربين:

- ١- يدون المربي في سجل خاص: تاريخ التلقيح، وتاريخ الولادة، وعدد المواليد لكل انثى، ويرقمهم ويدون سلالتهم.
- ٢- يجب استشارة الطبيب عند وجود مشاكل صحية على الجلد أو في الجهاز الهضمي ، والعيون.
- ٣* ويجب حلب الأنثى بشكل منتظم حتى لا يحتقن الضرع ويصاب بالالتهاب ، كما يجب تطعيمها ضد الأمراض ، وتقليم الأظلاف كل شهرين ، وخلع القرون في الأيام الأولى للولادة باستخدام مرهم خاص لنزع القرون ، أو باستخدام كاوي يعمل بالحرارة.